

形成外科(眼瞼下垂・内反症)手術を受ける患者様へ

患者名		様	主治医	受持看護師	退院予定日(/ 頃)
経過	入院当日			術後	
月日	手術後			1日目(退院日)	
	月 日			月 日	
治療	<input type="checkbox"/> 患部を冷やして、腫れを予防します。 <input type="checkbox"/> 本日寝る前より、鏡を見ながら創部に軟膏を塗っていきます。 <input type="checkbox"/> 傷の周りのむくみを抑える漢方薬を夕食前に飲みます。(翌日からは毎食前に) <input type="checkbox"/> 寝る前に、洗顔後眼軟膏を塗ります。	<input type="checkbox"/> 軟膏は外来診察時に持参をお願いします。	<input type="checkbox"/> 痛みがある時は痛み止めを使用します。お知らせください。	※退院後の注意点 ・創部の抜糸は、次回の外来診察日に行ないます。 ・患部を強く擦らないようにしてください。 ・抜糸してからも3週間くらいはアイメイク類は控えて下さい。 ・運動・仕事・飲酒は、次回外来診察日まで控えて下さい。その後は再診時に主治医にお尋ね下さい。	
栄養	<input type="checkbox"/> 常食	<input type="checkbox"/> 常食	<input type="checkbox"/> 常食	*眼軟膏の注意点* ①軟膏を手に取り取る前に、手をしっかり洗って清潔にして下さい。 ②軟膏をチューブより1cm程度出す。 ③鏡を見ながら、まぶたの上の創の部分に優しく塗って下さい。全体的に創になじめば十分です。 ④軟膏は1日2回程度塗って下さい。	
活動	<input type="checkbox"/> 自由	<input type="checkbox"/> 自由	<input type="checkbox"/> 自由		
清潔	<input type="checkbox"/> 入浴・洗髪できます	<input type="checkbox"/> 創を濡らさないようにシャワーできます。(濡れてはいけない部位は、看護師にお尋ね下さい) <input type="checkbox"/> 洗顔も可能です。(創部は泡をしっかり立てて、優しく洗って下さい。)			
説明	<input type="checkbox"/> 入院前の様子をうかがいます <input type="checkbox"/> 病棟内をご案内します(入院案内のビデオをご覧ください) <input type="checkbox"/> 薬剤師が薬の説明に伺います				

※わからないことなど遠慮なくお尋ねください

※この予定表は、病状により変更の可能性がございます。ご了承ください。 大牟田市立病院 形成外科 H26. 4~

