

# レジメン名【TIP】

1コース:21日間

薬品名			day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
一般名	商品名	投与量																					
パクリタキセル	パクリタキセル	250mg/m <sup>2</sup>	●																				
イホスファミド	イホマイド	1.5g/m <sup>2</sup>		●	●	●	●																
メスナ	ウロミテキサン	500mg/m <sup>2</sup> /回 (1.5g/m <sup>2</sup> /日)		●	●	●	●																
シスプラチン	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>		●	●	●	●																
ペグフィルグラスチム	ジーラスタ	3.6mg皮下注							●														

休薬完了

Day1

9:30-10:00 30分  
デキサート19.8mg  
クロール・トリメトン注10mg  
ファモチジン注射用20mg  
生食50mL

10:00-翌10:00 24時間  
パクリタキセル 250mg/m<sup>2</sup>  
5%ブドウ糖 500mL  
(初回と2回目は10分チェック法で投与・最初の10分間は25%の速度)→PTXの過敏症対策です

Day2

day2-6 イメンドカプセル125、80、80、80、80 内服

【Day2】ウロミテキサン9A+生食50mL  
①12:30-13:00 (IFM開始時) ②15:30-16:00 (IFM開始3時間後) ③20:30-21:00 (IFM開始8時間後)

10:00-10:30 30分  
アロキン0.75mg  
デキサート9.9mg

10:30-12:30 2時間  
ソルデム1 500mL  
メイロン7% 20mL

12:30-14:30 2時間  
イホマイド1.5g/m<sup>2</sup>  
生食 500mL

14:30-16:30 2時間  
ソルデム1 500mL  
メイロン7% 20mL

16:30-18:30 2時間  
シスプラチン25mg/m<sup>2</sup>  
生食 500mL

18:30-18:45 15分  
ラシックス注20mg  
生食 50mL

18:45-20:45 2時間  
ソルデム1 500mL  
メイロン7% 20mL

20:45-22:45 2時間  
ソリアセットD 500mL

Day3~5

【Day3~5】ウロミテキサン9A+生食50mL  
①12:30-13:00 (IFM開始時) ②15:30-16:00 (IFM開始3時間後) ③20:30-21:00 (IFM開始8時間後)

10:00-10:30 30分  
デキサート6.6mg  
生食50mL

10:30-12:30 2時間  
ソルデム1 500mL  
メイロン7% 20mL

12:30-14:30 2時間  
イホマイド1.5g/m<sup>2</sup>  
生食 500mL

14:30-16:30 2時間  
ソルデム1 500mL  
メイロン7% 20mL

16:30-18:30 2時間  
シスプラチン25mg/m<sup>2</sup>  
生食 500mL

18:30-17:45 15分  
ラシックス注20mg  
生食 50mL

18:45-20:45 2時間  
ソリアセットD 500mL

20:45-22:45 2時間  
ソリアセットD 500mL

Day6

30分  
デキサート6.6mg  
生食50mL

2時間  
ソリアセットF 500mL

2時間  
ソリアセットD 500mL

2時間  
ソリアセットD 500mL

Day7

皮下注射  
ジーラスタ皮下注3.6mg(持続型G-CSF製剤)