

レジメン名【BEP(婦人科)】

1コース:21日間

薬品名		投与量																					
一般名	商品名		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
プレオマイシン	プレオ	20mg/m ²		●							●							●					
シスプラチン	シスプラチン	20mg/m ²	●	●	●	●	●																
エトポシド	ベブシド	100mg/m ²	●	●	●	●	●																

day1

アロキシ0.75mg/バッグ デキサート注射液9.9mg 15分	ベブシド 100mg/m ² 生食 500mL 1時間	生食 500mL アスハラK 1A 硫酸Mg 1A 1時間	CDDP 20mg/m ² 生食 500mL 1.5時間	生食 50mL ラシックス 1A 15分	生食 1000mL アスハラK 1A 2時間	生食シリンジ
--	--	--	---	----------------------------	------------------------------	--------

day2

生食 100ml デキサート注射液6.6mg 15分	プレオ 20mg/m ² 生食 100ml 30分	ベブシド 100mg/m ² 生食 500mL 1時間	生食 500mL アスハラK 1A 硫酸Mg 1A 1時間	CDDP 20mg/m ² 生食 500mL 1.5時間	生食 50mL ラシックス 1A 15分	生食 1000mL アスハラK 1A 2時間	生食シリンジ
----------------------------------	--	--	--	---	----------------------------	------------------------------	--------

day3-5

生食 100ml デキサート注射液6.6mg 15分	ベブシド 100mg/m ² 生食 500mL 1時間	生食 500mL アスハラK 1A 硫酸Mg 1A 1時間	CDDP 20mg/m ² 生食 500mL 1.5時間	生食 50mL ラシックス 1A 15分	生食 1000mL アスハラK 1A 2時間	生食シリンジ
----------------------------------	--	--	---	----------------------------	------------------------------	--------

day9,16

プレオ 20mg/m ² 生食 100ml 30分	生食 50ml
--	---------

※特記事項※

1) 制吐剤 : day1-5 イメンドカプセル125、80、80、80、80 内服