

| | |
|-------|----------------|
| レジメン名 | CCRT |
| 1 コース | 7日間 (5~6コース予定) |

| 順 | 投与方法 | 医薬品名 (投与量) | 投与時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|------|--|------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ※放射線治療※ 外部 (全骨盤) 照射の場合： 1.8-2Gy, 週5回, Total45-50.4Gy/25-28回 高線量率腔内照射の場合： 6Gy/回, 週1回, Total12-24Gy/2-4回 | | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| | 経口 | デカドロン (8mg) | | | ● | ● | | | | |
| 1 | 点滴静注 | 生食 (500mL) アスパラカリウム (10mEq) 硫酸Mg補正液 (20mEq) | 1時間 | ● | | | | | | |
| 2 | 点滴静注 | プロイメンド (150mg) 生食 (250mL) | 30分 | ● | | | | | | |
| 3 | 点滴静注 | アロキシ (0.75mg) デキサート (9.9mg) | 30分 | ● | | | | | | |
| 4 | 点滴静注 | 生食 (100mL) | | ● | | | | | | |
| 5 | 点滴静注 | シスプラチン (40mg/m ²) 生食 (500mL) | 90分 | ● | | | | | | |
| 6 | 点滴静注 | ラシックス (20mg) 生食 (50mL) | 15分 | ● | | | | | | |
| 7 | 点滴静注 | 生食 (1000mL) アスパラカリウム (10mEq) | 2時間 | ● | | | | | | |

休薬完了