| レジメン名 | RAM＋PTX |
|---|---|
| 1コース | 28日間 |

| 順 | 投与方法 | 医薬品名（投与量） | 投与時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 点滴静注 | グラニセトロン（3mg）<br>デキサート（6.6mg）<br>ファモチジン（20mg）<br>ポララミン（5mg） | 30分 | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | 休薬完了 |
| 2 | 点滴静注 | サイラムザ（8mg/kg）<br>生食（250mL） | 1時間 | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 点滴静注 | パクリタキセル（80mg/㎡）<br>5%ブドウ糖（250mL） | 1時間 | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 点滴静注 | 生食（50mL） | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | フラッシュ | 生食シリンジ（10mL） | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |