

レジメン名	S1+CDDP
1コース	35日間

順	投与方法	医薬品名 (投与量)	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
	経口	エスワнтаイホウ配合錠		分 <sup>1</sup> 夕	分 <sup>2</sup>	分 <sup>2</sup>	分 <sup>2</sup>	分 <sup>2</sup>	分 <sup>2</sup>	分 <sup>2</sup>	分 <sup>2</sup>	分 <sup>2</sup>	分 <sup>2</sup>	分 <sup>2</sup>	分 <sup>2</sup>	分 <sup>2</sup>	分 <sup>2</sup>	分 <sup>2</sup>	分 <sup>2</sup>	分 <sup>2</sup>	分 <sup>2</sup>	分 <sup>2</sup>	分 <sup>2</sup>	分 <sup>2</sup>	分 <sup>1</sup> 朝													
	経口	イメンド (125mg)									●																											
	経口	イメンド (80mg)									●	●																										
	経口	デキサメタゾン (8mg)									(●)	(●)	(●)																									
1	点滴静注	生食 (1000mL) アスパラカリウム (10mEq) 硫酸Mg補正液 (20mEq)	2時間								●																											
2	点滴静注	アロキシ (0.75mg) デキサート (9.9mg)	15分								●																											
3	点滴静注	シスプラチン (60mg/m <sup>2</sup> ) 生食 (500mL)	90分								●																											
4	点滴静注	ラシックス (20mg) 生食 (50mL)	15分								●																											
5	点滴静注	生食 (1000mL) アスパラカリウム (10mEq)	2時間								●																											
6	フラッシュ	生食シリンジ (10mL)									●																											

休薬完了

エスワнтаイホウ配合錠の用量	
体表面積	初回基準量 (テガフル相当量)
1.25m <sup>2</sup> 未満	40mg/回
1.25m <sup>2</sup> 以上 ~ 1.5 m <sup>2</sup> 未満	50mg/回
1.5 m <sup>2</sup> 以上	60mg/回