

レジメン名	オプジーボ+XELOX
1コース	21日間

順	投与方法	医薬品名 (投与量)	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	経口	カペシタビン錠		分1 タ	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分1 朝						
1	点滴静注	生食 (50mL)		●																				
2	点滴静注	オプジーボ (360mg/body) 生食 (100mL)	30分	●																				
1	点滴静注	グラニセトロン (3mg) デキサート (6.6mg) ファモチジン (20mg) ポララミン (5mg)	30分	●																				
2	点滴静注	オキサリプラチン (130mg/m <sup>2</sup> ) 5%ブドウ糖 (250mL) デキサート (3.3mg)	2時間	●																				
3	点滴静注	5%ブドウ糖 (100mL)		●																				
4	フラッシュ	生食シリンジ (10mL)		●																				

休薬完了

カペシタビン錠の用量	
体表面積	1回用量
1.36m <sup>2</sup> 未満	1200mg/回
1.36m <sup>2</sup> 以上 ~ 1.66 m <sup>2</sup> 未満	1500mg/回
1.66m <sup>2</sup> 以上 ~ 1.96 m <sup>2</sup> 未満	1800mg/回
1.96m <sup>2</sup> 以上	2100mg/回