

|       |      |
|-------|------|
| レジメン名 | HP   |
| 1 コース | 21日間 |

| 順 | 投与方法  | 医薬品名 (投与量)   | 投与時間                | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|-------|--|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 点滴静注  | 生食 (100mL)   |                     | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2 | 点滴静注  | パージェタ (初回840mg/body、<br>2回目以降420mg/body)<br>生食 (250mL) | 1時間                 | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3 | 点滴静注  | ハーセプチン (初回8mg/kg、<br>2回目以降6mg/kg)<br>生食 (250mL)        | 初回90分<br>以後60分<br>可 | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4 | フラッシュ | 生食シリンジ (10mL)  |                     | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

休薬完了