

レジメン名	Bmab + FOLFIRI
1 コース	14日間

順	投与方法	医薬品名 (投与量)	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	点滴静注	生食 (50mL)		●													
2	点滴静注	アバスチン (5mg/kg) 生食 (100mL)	初回90分 ※	●													
3	点滴静注	グラニセトロン (3mg) デキサート (6.6mg)	30分	●													
4	点滴静注	イリノテカン (150mg/m <sup>2</sup> ) 5%ブドウ糖 (250mL)	2時間	●													
4	点滴静注	レボホリナート (200mg/m <sup>2</sup> ) 5%ブドウ糖 (250mL)	2時間	●													
5	点滴静注	5-FU (400mg/m <sup>2</sup> ) 5%ブドウ糖 (50mL)	5分	●													
6	点滴静注	5-FU (2400mg/m <sup>2</sup> ) ソルデム 3 A (1000mL)	46時間	●	→												
7	点滴静注	生食 (50mL)				●											
8	フラッシュ	生食シリンジ (10mL)				●											

イリノテカンと  
レボホリナートは同時投与

休薬完了

※初回は90分で投与。忍容性良好なら2回目60分、3回目30分投与可能。