

レジメン名	Bmab + SOX
1 コース	21日間

順	投与方法	医薬品名 (投与量)	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	経口	エスワンタイハウ配合錠		分1 夕	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分1 朝						
1	点滴静注	アバスチン (7.5mg/kg) 生食 (100mL)	初回90分 ※	●																				
2	点滴静注	グラニセトロン (3mg) デキサート (6.6mg) ファモチジン (20mg) ポララミン (5mg)	30分	●																				
3	点滴静注	オキサリプラチン (130mg/m ²) 5%ブドウ糖 (250mL) デキサート (3.3mg)	2時間	●																				
4	点滴静注	5%ブドウ糖 (100mL)		●																				
5	フラッシュ	生食シリンジ (10mL)		●																				

休薬完了

エスワンタイハウ配合錠の用量	
体表面積	初回基準量 (テガフル相当量)
1.25m ² 未満	40mg/回
1.25m ² 以上 ~ 1.5 m ² 未満	50mg/回
1.5 m ² 以上	60mg/回

※初回は90分で投与。忍容性良好なら2回目60分、3回目30分投与可能。