

レジメン名	Bmab + XELOX
1 コース	21日間

順	投与方法	医薬品名 (投与量)	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	経口	カベシタビン錠		分1 タ	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分1 朝						
1	点滴静注	アバスチン (7.5mg/kg) 生食 (100mL)	初回90分 ※	●																				
1	点滴静注	グラニセトロン (3mg) デキサート (6.6mg) ファモチジン (20mg) ポララミン (5mg)	30分	●																				
2	点滴静注	オキサリプラチン (130mg/m ²) 5%ブドウ糖 (250mL) デキサート (3.3mg)	2時間	●																				
3	点滴静注	5%ブドウ糖 (100mL)		●																				
4	フラッシュ	生食シリンジ (10mL)		●																				

休薬完了

ゼローダ錠の用量	
体表面積	1回用量
1.36m ² 未満	1200mg/回
1.36m ² 以上 ~ 1.66 m ² 未満	1500mg/回
1.66m ² 以上 ~ 1.96 m ² 未満	1800mg/回
1.96m ² 以上	2100mg/回

※初回は90分で投与。忍容性良好なら2回目60分、3回目30分投与可能。