

レジメン名	Cmab + FOLFIRI
1 コース	14日間

順	投与方法	医薬品名 (投与量)	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	点滴静注	グラニセトロン (3mg) デキサート (6.6mg) ポララミン (5mg) ファモチジン (20mg)	30分	●							● ※						
2	点滴静注	※アービタックス (初回400mg/m ²) 生食 (500mL)	初回2時間	●													
2	点滴静注	※アービタックス (2回目以降250mg/m ²) 生食 (250mL)	2回目以降 1時間								●						
3	点滴静注	生食 (250mL)	1時間	●							●						
4	点滴静注	イリノテカン (150mg/m ²) 5%ブドウ糖 (250mL)	2時間	●													
4	点滴静注	レポホリナート (200mg/m ²) 5%ブドウ糖 (250mL)	2時間	●													
5	点滴静注	5-FU (400mg/m ²) 5%ブドウ糖 (50mL)	5分	●													
6	点滴静注	5-FU (2400mg/m ²) ソルデム 3A (1000mL)	46時間	●	→												
7	フラッシュ	生食シリンジ (10mL)				●					●						

休薬完了

※アービタックスは初回400mg/m²、2回目以降は250mg/m²

※day8の前投薬はグラニセトロンなし。代わりに生食50mL