

レジメン名	Cmab + mFOLFOX6
1 コース	14日間

順	投与方法	医薬品名 (投与量)	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	点滴静注	グラニセトロン (3mg) デキサート (6.6mg) ポララミン (5mg) ファモチジン (20mg)	30分	●							● ※							休 薬 完 了
2	点滴静注	※アービタックス (初回400mg/m <sup>2</sup> ) 生食 (500mL)	初回2時間	●														
2	点滴静注	※アービタックス (2回目以降250mg/m <sup>2</sup> ) 生食 (250mL)	2回目以降 1時間								●							
3	点滴静注	生食 (250mL)	1時間	●							●							
4	点滴静注	オキサリプラチン (85mg/m <sup>2</sup> ) 5%ブドウ糖 (250mL)	2時間	●														
4	点滴静注	レポホリナート (200mg/m <sup>2</sup> ) 5%ブドウ糖 (250mL)	2時間	●														
5	点滴静注	5-FU (400mg/m <sup>2</sup> ) 5%ブドウ糖 (50mL)	5分	●														
6	点滴静注	5-FU (2400mg/m <sup>2</sup> ) ソルデム 3A (1000mL)	46時間	●	→													
7	フラッシュ	生食シリンジ (10mL)				●					●							

※アービタックスは初回400mg/m<sup>2</sup>、2回目以降は250mg/m<sup>2</sup>

※day8の前投薬はグラニセトロンなし。代わりに生食50mL