レジメン名	Bmab＋ロンサーフ
1コース	28日間

順	投与方法	医薬品名（投与量）	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	経口	ロンサーフ配合錠※		分2	分2	分2	分2	分2			分2	分2	分2	分2	分2																休薬完了
1	点滴静注	アバスチン（7.5mg/kg） 生食（100mL）	初回90分 ※	●														●													
3	点滴静注	生食（50mL）		●														●													
4	フラッシュ	生食シリンジ（10mL）		●														●													

※ロンサーフ錠の用量※	
体表面積	初回基準量(FTD相当量)
1.07㎡未満	35mg/回(70mg/日)
1.07㎡以上 ～ 1.23 ㎡未満	40mg/回(80mg/日)
1.23㎡以上 ～ 1.38 ㎡未満	45mg/回(90mg/日)
1.38㎡以上 ～ 1.53 ㎡未満	50mg/回(100mg/日)
1.53㎡以上 ～ 1.69 ㎡未満	55mg/回(110mg/日)
1.69㎡以上 ～ 1.84 ㎡未満	60mg/回(120mg/日)
1.84㎡以上 ～ 1.99 ㎡未満	65mg/回(130mg/日)
1.99㎡以上 ～ 2.15 ㎡未満	70mg/回(140mg/日)
2.15㎡以上	75mg/回(150mg/日)

※初回は90分で投与。忍容性良好なら2回目60分、3回目30分投与可能。