

# 【R-CHOP】

## 投与スケジュール

[商品名(一般名)]	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	...	15	...	22	...	28
リツキサン(リツキシマブ)	375mg/m <sup>2</sup>	●													
エンドキサン(シクホスファミド)	750mg/m <sup>2</sup>	●													
ドキシロピシン(ドキシロピシン)	50mg/m <sup>2</sup>	●													
オンコビン(ビンクリスチン)	1.4mg/m <sup>2</sup>	●													
プレドニゾン(プレドニゾン)	40mg/m <sup>2</sup>	●	●	●	●	●									

**投与法**

Day1-5  
PSL 40mg/m<sup>2</sup> p.o

day1

リツキサン投与前  
(30分前)内服  
カロナール2錠  
タベジール1錠

ルート確保  
生食50ml

リツキサン375mg/m<sup>2</sup>  
生食450ml  
※リツキサン500mgに対して生食450ml ※リツキサン100mgに対して生食90ml  
※計算で求められた値の10の位を切り上げる。例)535mgの場合600mg投与

day1or3

グラセトロン3mg  
30分

オンコビン1.4mg/m<sup>2</sup>  
(2mg/bodyまで)  
生食50ml 5分全開

ドキシロピシン50mg/m<sup>2</sup>  
生食50ml  
5分全開

エンドキサン750mg/m<sup>2</sup>  
生食500ml  
120分

生食  
50ml