

【R-T-COP】 投与スケジュール

[商品名(一般名)]	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	...	15	...	22	...	28
リツキサン(リツキシマブ)	375mg/m ²	●													
エンドキサン(シクホスファミド)	750mg/m ²	●		(●)											
ピラルビン(ピラルビシン)	50mg/m ²	●		(●)											
オンコビン(ビンクリスチン)	1.4mg/m ²	●		(●)											
プレドニゾン(プレドニゾン)	100mg/body	●	●	●	●	●	(●)	(●)							

T-COP
Day1 or Day3

投与法

day1

リツキサン投与前
(30分前)内服
カロナール2錠
タベジール1錠

ルート確保
生食50ml
or
生食100mL

リツキサン375mg/m²
生食450ml
※リツキサン500mgに対して生食450ml
※リツキサン100mgに対して生食90ml

リツキサン投与量
計算で求められた値の10の位を切り上げる。例)535mgの場合600mg投与

PSL 100mg/body or 40mg/m² p.o
Day1-5 or Day3-7

day1or3

グラニセトロン3mg
30分

オンコビン1.4mg/m²
(2mg/bodyまで)
生食50ml 15分

ピラルビン50mg/m²
5%ブドウ糖100ml
30分

エンドキサン750mg/m²
生食500ml
120分

生食
50ml