

【G-CHOP】

投与スケジュール

[商品名(一般名)]	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	...	21
ガザイバ [®] (オビヌス [®] マブ [®])	1000mg	●									
エンドキサン(シクホスファミド [®])	750mg/m ²	●									
ドキシルビシン(ドキシルビシン)	50mg/m ²	●									
オンコビン(ビンクリスチン)	1.4mg/m ²	●									
プレートニゾロン(プレートニゾロン)	40mg/m ²	●	●	●	●	●					

投与方法

Day1-5
PSL 40mg/m² p.o

day1

ガザイバ投与前
(30分前) 内服
カロナール2錠
タベジール1錠

ルート確保
生食100ml

ガザイバ 1000mg
生食210ml
投与速度は※参照

グラネセロン3mg
30分

オンコビン1.4mg/m²
(2mg/bodyまで)
生食50ml 5分全開

ドキシルビシン50mg/m²
生食50ml
5分全開

エンドキサン750mg/m²
生食500ml
120分

※維持療法(2ヶ月毎 2年間)

day1

ガザイバ投与前
(30分前) 内服
カロナール2錠
タベジール1錠

ルート確保
生食100ml

ガザイバ 1000mg
生食210ml
投与速度は※参照

※初回投与時は、最初の1時間は50mg (12.5mL) /時の速度で点滴静注を開始し、患者の状態を十分観察しながら、30分毎に50mg (12.5mL) /時ずつ、最大400mg (100mL) /時まで上げることができる。

なお2回目以降の投与開始速度は、前回の投与でGrade2以上のinfusion reactionが発現しなかった場合は、100mg (25mL) /時で投与を開始し、30分毎に100mg (25mL) /時ずつ、最大400mg (100mL) /時まで上げることができる。