

【C-mab+FP】

投与スケジュール

[商品名(一般名)]	投与量	1	2	3	4	5	8	15	21
セツキシマブ	400・ 250 mg/m ²	●					●	●	
シスプラチン (CDDP)	100 mg/m ²	●							休業
フルオロウラシル (5-FU)	1000 mg/m ²	●	●	●	●				休業

	①メインルート	時間	②側管	時間	内服	うがい
Day 0	ソルアセトF 500mL × 2本 (24時間)	翌朝9時まで	—		—	—
Day 1	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg 1袋 デキサート 3A ボラミン注5mg 1A ファモチジン注射用20mg 1A	9時-10時	—		朝食後 プロテカジン錠10 1錠	
	アービタックス(400mg/m ²) 生食500mL	10時-12時				
	プロイメド注 生食250mL	12時-12時30分				
	生食250mL	12時30分-13時				
	シスプラチン(100mg/m ²) 生食500mL	13時-16時				
	5FU(1000mg/m ²) フィジオ140輸液 500mL	16時-翌16時 (24時間)			生食500mL	
Day 2	5FU(1000mg/m ²) フィジオ140輸液 500mL	16時-翌16時 (24時間)	ソルアセトF 500mL	8時30分-10時	朝食後 プロテカジン錠10 1錠	
			デキサート注射液3.3mg 2A 生食100mL	10時-10時30分	夕食後 プロテカジン錠10 1錠	
			ソルアセトF 1000mL	11時-21時		
Day 3	5FU(1000mg/m ²) フィジオ140輸液 500mL	16時-翌16時 (24時間)	デキサート注射液3.3mg 2A 生食100mL	10時-10時30分	朝食後 プロテカジン錠10 1錠	
			ソルアセトF 1000mL	11時-21時	夕食後 プロテカジン錠10 1錠	
Day 4	5FU(1000mg/m ²) フィジオ140輸液 500mL	16時-翌16時 (24時間)	デキサート注射液3.3mg 2A 生食100mL	10時-10時30分	プロテカジン錠10 2錠2× (Day7まで)	
			ソルアセトF 1000mL	11時-21時		
Day 5					プロテカジン錠10 2錠2× (Day7まで)	
Day 6	—		—			
Day 7						

含嗽用ハチアズレ顆粒
1日4回 うがい
(Day7まで)