

【TPF】

投与スケジュール

【商品名(一般名)】	投与量	1	2	3	4	5	.....	21
ドセタキセル (DTX)	60 mg/m <sup>2</sup>	●						休業
シスプラチン (CDDP)	60 mg/m <sup>2</sup>	●						休業
フルオロウラシル (5-FU)	1000 mg/m <sup>2</sup>	●	●	●	●			休業

	①メインルート	時間	②側管	時間	内服	うがい
Day 0	ソリアセトF 500mL × 2本 (24時間)	翌朝9時まで	—		—	—
Day 1	プロイメンド注 生食250mL	9時-9時30分	—		朝食後 プロテカジン錠10 1錠	
	アロキシ注0.75mg 1袋 デキサート 3A	9時30分-10時				
	ドセタキセル(60mg/m <sup>2</sup> ) 生食500mL	10時-12時				
	生食250mL	12時-13時				
	シスプラチン(60mg/m <sup>2</sup> ) 生食500mL	13時-16時				
	5FU(1000mg/m <sup>2</sup> ) フィジオ140輸液 500mL	16時-翌16時 (24時間)				
Day 2	5FU(1000mg/m <sup>2</sup> ) フィジオ140輸液 500mL	16時-翌16時 (24時間)	ソリアセトF 500mL	9時-10時30分	朝食後 プロテカジン錠10 1錠	含嗽用ハチアズレ顆粒 1日4回 うがい (Day7まで)
			デキサート注射液3.3mg 2A 生食100mL	10時30分-11時	夕食後 プロテカジン錠10 1錠	
Day 3	5FU(1000mg/m <sup>2</sup> ) フィジオ140輸液 500mL	16時-翌16時 (24時間)	デキサート注射液3.3mg 2A 生食100mL	10時30分-11時	朝食後 プロテカジン錠10 1錠	
			—		夕食後 プロテカジン錠10 1錠	
Day 4	5FU(1000mg/m <sup>2</sup> ) フィジオ140輸液 500mL	16時-翌16時 (24時間)	デキサート注射液3.3mg 2A 生食100mL	10時30分-11時	プロテカジン錠10 2錠2× (Day7まで)	
			—			
Day 5						
Day 6	—				プロテカジン錠10 2錠2× (Day7まで)	
Day 7						